


Kurzanleitung subkutane Selbstinjektion mit der Hepaxane®-Fertigspritze

Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat Ihnen Hepaxane® verschrieben. Diese Kurzanleitung dient als Hilfe für die Durchführung der Injektion. Diese Informationen ersetzen nicht das Lesen der Packungsbeilage. Hepaxane muss strikt gemäss den Anweisungen des Arztes angewendet werden. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin setzt die Dosierung und die Behandlungsdauer fest.




Die Hepaxane®-Fertigspritze ist direkt gebrauchsfertig und enthält eine Einzeldosis. Nach dem Gebrauch wird die Fertigspritze komplett entsorgt.

Vor der Injektion



- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.
- Kontrollieren Sie die Spritze. Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn sie beschädigt ist oder wenn die Lösung darin nicht klar erscheint.
- Eine möglicherweise vorhandene Luftblase in der Spritze soll vor der Injektion **nicht** entfernt werden.

Auswahl und Reinigung der Injektionsstelle



● Injektionsbereiche am Bauch


- Hepaxane® wird tief subkutan (unter die Haut) injiziert. Wählen Sie einen Bereich auf der rechten oder linken Bauchseite. Wechseln Sie die Injektionsstelle bei nachfolgenden Injektionen jedes Mal, abwechselnd auf der linken bzw. rechten Bauchseite.



- Waschen Sie sich vor der Injektion Ihre Hände.
- Legen Sie sich für die Injektion bitte hin.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle nach Anweisung des medizinischen Personals.

HEPAXANE®

Durchführung der Injektion



- Ziehen Sie die Blisterpackung in Pfeilrichtung auf und entnehmen Sie die Fertigspritze. Ziehen Sie dabei nicht am Kolben, denn dadurch könnte die Spritze beschädigt werden.

Ziehen Sie den Nadelschutz gerade von der Spritze ab.



- Greifen Sie mit Zeigefinger und Daumen der einen Hand vorsichtig den gesäuberten Bauchbereich so, dass sich eine Hautfalte bildet. Sie müssen die Hautfalte während des gesamten Injektionsvorgangs festhalten.




- Führen Sie die Nadel in ihrer ganzen Länge **senkrecht** in die Hautfalte ein und spritzen Sie das Arzneimittel, indem Sie den Spritzenkolben ganz nach unten drücken.



- Entfernen Sie die Nadel von der Einstichstelle. Halten Sie dabei den Finger auf dem Spritzenkolben.
- Um blaue Flecken zu vermeiden, sollten Sie die Injektionsstelle nach der Injektion nicht reiben.

Nach der Injektion



- Die Fertigspritzen sind mit einem Nadelschutz ausgestattet. Halten Sie den Spritzenkörper nach Abschluss der Injektion mit einer Hand fest. Fassen Sie mit der anderen Hand den «Kragen» unten an der Spritze und ziehen Sie daran, bis Sie ein Klicken wahrnehmen. Die gebrauchte Nadel ist jetzt vollkommen abgeschirmt.
- Entsorgen Sie die Spritze sofort nach der Injektion in einem geeigneten Behältnis.

Nach Beendigung der Behandlung das Arzneimittel mit dem restlichen Inhalt Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin zum fachgerechten Entsorgen bringen.

Patienten- und Fachinformationen - Stand April 2020 - Ausführliche Angaben finden Sie in der Packungsbeilage und auf der Swissmedic Plattform publiziert: www.swissmedicinfo.ch.

Zulassungsinhaberin: EFFIK S.A., Rue du Marché 10, 1260 NYON